

# DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS DE LA DMLA

Par :

Professeur Stéphanie Bailif



Docteur Célia Maschi



Docteur Mayer Srour



Professeur Eric Souied



## DURÉE :

4 heures 15

## LANGUE(S) :

Français

## PRÉ-REQUIS :

Professionnel de santé

## FINANCEMENT :

OPCO  
Personnel

## OBJECTIFS :

- Identifier un nœvus ou un hémangiome choroïdien avec une échographie avant toute injection intravitréenne IVT
- Différencier un NVC de la DMLA d'un NVC compliquant une myopie forte
- Diagnostiquer les vasculopathies polypoïdales choroïdiennes et adapter la thérapeutique
- Identifier les signes cliniques des dystrophies maculaires héréditaires et s'orienter dans son arbre décisionnel

## DESCRIPTION :

Il est essentiel de différencier une DMLA exsudative des autres causes possibles d'exsudation (nœvus exsudatif ou compliqué d'une néovascularisation choroïdienne, hémangiome, PEHCR Peripheral Exsudative Hemorrhagic chorioretinopathy) ou de néovascularisation (néovaisseau choroïdien NVC du myope fort, inflammatoire ou idiopathique du sujet jeune). En effet, la prise en charge de ces patients est différente de celle de la DMLA exsudative.

Si la VPC est le plus souvent idiopathique, elle peut également être secondaire à une DMLA exsudative. Il est donc important de reconnaître une VPC et de la différencier d'une DMLA exsudative pour adapter au mieux la prise en charge de son patient.

Les dystrophies maculaires héréditaires sont des pathologies qui peuvent être rencontrées en consultation ophtalmologique. Savoir les identifier et surtout savoir prescrire et réaliser les bons examens complémentaires à leurs diagnostics est essentiel pour la prise en charge de ces patients souvent jeunes.

## CHAPITRES :

Test initial

Introduction

### 1. Il y a une exsudation mais ce n'est pas une DMLA

- Nœvi atypiques
- Complication d'un nœvus non suspect
- Hémangiomes choroïdiens circonscrits

- Chorioretinopathie exsudative et hémorragique périphérique : une DMLA périphérique ?
- Cas cliniques

## 2. Il y a un néovaisseau choroïdien mais ce n'est pas une DMLA

- Néovaisseau choroïdien du myope fort
- Néovaisseau choroïdien idiopathique du sujet jeune
- Néovaisseau choroïdien inflammatoire
- Cas cliniques

## 3. Diagnostic différentiel de la DMLA : la vasculopathie polypoïdale choroïdienne VPC

- Étiologies de la VPC
- Les examens nécessaires au diagnostic
- Classification de la VPC
- Spectre des traitements
- Cas cliniques sur les VPC

## 4. Les dystrophies maculaires héréditaires, quels examens pour orienter le diagnostic ?

- Dystrophie maculaire de Stargardt
- Dystrophie maculaire de Best
- Dystrophies des cônes
- Rétinoschisis lié à l'X
- Dystrophies réticulées
- Drusen juvéniles
- Cas cliniques

Test final

---

### ORGANISME DE FORMATION

OPHTANEO Académie  
170 avenue du Pastré  
Aubagne, 13400  
SIRET: 83894147400010  
Code APE : 8559A  
N°Activité : 93131712713  
N°TVA : FR63838941474  
N° ODPIC: 8844

### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

La formation non présentielle permet au professionnel de santé de se former quand il le souhaite et où il le souhaite.  
Les interventions vidéo des orateurs, les illustrations, les animations ainsi que les quizz permettent un format non présentiel.

### DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA FORMATION

Pré-test d'évaluation des connaissances  
Post-test d'évaluation de la progression